

Nom du vaccin	Type de vaccin	Schéma vaccinal	Indications habituelles	Contre- indications	Particularités
Diphtérie-Tétanos-Polio (Revaxis)	Anatoxine/virus inactivé	* <u>enfant</u> : M0, M1, M2, A1 * <u>jusqu'à 20 ans</u> : rappel tous les 5 ans * <u>adulte > 20 ans</u> : rappel tous les 10 ans Si dernier rappel < ou = 10 ans : une seule injection Si dernier rappel > 10 ans : M0 et M1 puis A10	Indispensable à mettre à jour	aucune	
Diphtérie-Tétanos-Polio coqueluche (Repevax)	Anatoxine/virus inactivé	1 injection en IM (au lieu d'1 revaxis°)	à faire 1 fois dans la vie d'adulte au sein du schéma du DTP	aucune	Peut être fait 2 ans après 1 DTP
Hépatite A et B (Twinrix)	Virus inactivé et Recombinant	M0, M1, M6 à M12 ; rappel tous les 5 ans Schéma accéléré : J0, J7, J21 et rappel à M12		SEP, maladies démyélinisantes	Poursuivre toujours avec Twinrix
Hépatite A (Havrix, Avaxim)	Virus inactivé	M0, M6 à M12 et A10 (voire beaucoup plus ?)	surtout si voyage prolongé	grossesse	Possible à partir de 1 an
Hépatite B (Engerix)	Recombinant	<u>Non vacciné</u> : M0, M1, M6 ou M0, M2, M12 <u>Schéma accéléré</u> : J0, J7, J21 ou J0, J14 et J28 <u>Vacciné et < 25 ans</u> : pas de rappel <u>> 25 ans</u> : rappel à 5 ans puis 10 ans	Mettre à jour si voyage prolongé	SEP, maladies démyélinisantes	
Typhoïde (Typhim)	Polyoside	Une seule injection, valable 3 ans	Voyage prolongé uniquement, surtout Inde et Afrique du Nord	Grossesse (peu efficace) Enfant < 2 ans (inefficace)	
Typhoïde et hépatite A (Tyavax)	Polyoside et virus inactivé	Une seule injection <u>Rappels</u> : à 3 ans pour typhoïde ; M6 à M12 et A10 pour l'hépatite A		Grossesse Enfant < 16 ans (pas d'étude)	
Méningo A + C	Polyoside	Une seule injection , 10 jours avant le départ, valable 3 à 5 ans	Séjour prolongé en zone à risque (zone sahélienne ++), enfants ++	Enfant < 18 mois	Contexte épidémique
Rage	Virus inactivé	Préventif : J0, J7, J28, rappel à 12 mois puis tous les 3 ans	Expatriés, enfants +++ , professions exposées	Grossesse Allaitement	Ne dispense pas d'une vaccination curative en centre antirabique, en cas de morsure suspecte ++
Grippe (Mutagrip)	Virus inactivé	1 seule injection <u>Enfant</u> : ½ dose puis ½ dose à M1	avant le début de l'épidémie (jusqu'à la fin de l'épidémie) ; pays avec cas de grippe aviaire	Immunodépression sévère	